

様式6-2～6-7 健診有所見者状況（男女別・年代別）（平成20年度）

男性

	受診者数	摂取エネルギーの過剰										血管を傷つける										内臓脂肪症候群 以外の動脈硬化	臓器障害（は詳細検査）								
		腹囲		BMI		中性脂肪		ALT(GPT)		HDL		血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL		尿蛋白		クレアチニン		心電図		眼底検査	
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A	E	E/A	F	F/A	G	G/A	H	H/A	I	I/A	J	J/A	K	K/A	L	L/A	M	M/A	N	N/A	O	O/A	P
総数 (40～74歳)	1,095	474	43.3%	267	24.4%	308	28.1%	200	18.3%	109	10.0%	162	14.8%	745	68.0%	12	1.1%	558	51.0%	368	33.6%	578	52.8%	41	3.7%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%
40～49歳	96	38	39.6%	26	27.1%	33	34.4%	31	32.3%	10	10.4%	10	10.4%	54	56.3%	3	3.1%	31	32.3%	26	27.1%	53	55.2%	3	3.1%	0	0.0%		0.0%		0.0%
50～59歳	246	112	45.5%	73	29.7%	82	33.3%	59	24.0%	20	8.1%	44	17.9%	155	63.0%	3	1.2%	120	48.8%	90	36.6%	150	61.0%	5	2.0%	0	0.0%		0.0%		0.0%
60～69歳	493	214	43.4%	107	21.7%	134	27.2%	75	15.2%	47	9.5%	70	14.2%	350	71.0%	5	1.0%	250	50.7%	173	35.1%	265	53.8%	14	2.8%	2	0.4%		0.0%		0.0%
70～74歳	260	110	42.3%	61	23.5%	59	22.7%	35	13.5%	32	12.3%	38	14.6%	186	71.5%	1	0.4%	157	60.4%	79	30.4%	110	42.3%	19	7.3%	0	0.0%		0.0%		0.0%
(再掲) 65～74歳	552	235	42.6%	129	23.4%	123	22.3%	76	13.8%	61	11.1%	78	14.1%	401	72.6%	2	0.4%	321	58.2%	190	34.4%	256	46.4%	29	5.3%	1	0.2%		0.0%		0.0%

各項目の受診者数 (40～74歳)	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	346	1,095	56	1,095	1,095	1,095	1,095	57				
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	----	-------	-------	-------	-------	----	--	--	--	--

女性

	受診者数	摂取エネルギーの過剰										血管を傷つける										内臓脂肪症候群 以外の動脈硬化	臓器障害（は詳細検査）								
		腹囲		BMI		中性脂肪		ALT(GPT)		HDL		血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL		尿蛋白		クレアチニン		心電図		眼底検査	
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A	E	E/A	F	F/A	G	G/A	H	H/A	I	I/A	J	J/A	K	K/A	L	L/A	M	M/A	N	N/A	O	O/A	P
総数 (40～74歳)	1,383	223	16.1%	221	16.0%	209	15.1%	96	6.9%	30	2.2%	91	6.6%	967	69.9%	0	0.0%	600	43.4%	249	18.0%	865	62.5%	10	0.7%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%
40～49歳	133	14	10.5%	17	12.8%	12	9.0%	5	3.8%	4	3.0%	2	1.5%	59	44.4%	0	0.0%	28	21.1%	21	15.8%	71	53.4%	3	2.3%	0	0.0%		0.0%		0.0%
50～59歳	328	38	11.6%	46	14.0%	41	12.5%	26	7.9%	2	0.6%	17	5.2%	213	64.9%	0	0.0%	107	32.6%	49	14.9%	213	64.9%	2	0.6%	0	0.0%		0.0%		0.0%
60～69歳	656	124	18.9%	119	18.1%	109	16.6%	51	7.8%	14	2.1%	49	7.5%	480	73.2%	0	0.0%	304	46.3%	131	20.0%	421	64.2%	3	0.5%	1	0.2%		0.0%		0.0%
70～74歳	266	47	17.7%	39	14.7%	47	17.7%	14	5.3%	10	3.8%	23	8.6%	215	80.8%	0	0.0%	161	60.5%	48	18.0%	160	60.2%	2	0.8%	0	0.0%		0.0%		0.0%
(再掲) 65～74歳	610	114	18.7%	100	16.4%	113	18.5%	32	5.2%	18	3.0%	49	8.0%	482	79.0%	0	0.0%	335	54.9%	119	19.5%	373	61.1%	4	0.7%	1	0.2%		0.0%		0.0%

各項目の受診者数 (40～74歳)	1,383	1,383	1,383	1,383	1,382	1,383	331	1,382	44	1,383	1,383	1,383	1,381	44			
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	----	-------	-------	-------	-------	----	--	--	--

【参考】

判定基準	摂取エネルギーの過剰										血管を傷つける										内臓脂肪症候群 以外の動脈硬化	臓器障害（は詳細検査）								
	腹囲		BMI		中性脂肪		ALT(GPT)		HDL		血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL		尿蛋白		クレアチニン		心電図		眼底検査	
	男85cm以上 女90cm以上		25以上		150以上		31以上		40未満		空腹時100以上 随時140以上		5.2以上		7.0以上		130以上		85以上		120以上		+以上		男1.2以上 女1.0以上					

参考) 標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)
 但し、尿酸・クレアチニンについては標準的な健診・保健指導プログラム(暫定版)参照
 随時血糖については糖尿病治療ガイド2006-2007参照

* 赤字の基準値については変更が可能です。
 血糖...空腹時血糖のみを集計
 クレアチニン...男性1.3以上、女性1.2以上で集計

* 各項目の受診者数について

各項目において未実施者がいる場合(全体の受診者数と一致しない場合)は色づけしています。
 占有率については全受診者を母数に計算していますので、ご注意ください。